

# Funktioneller Kurzbefund

## CMD-Screening nach DC/TMD

Name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

### 1. Beweglichkeit des Unterkiefers bei Kieferöffnung

Vertikaler Überbiss \_\_\_\_\_ mm

Maximale aktive SKD trotz Schmerzen \_\_\_\_\_ mm

SUMME \_\_\_\_\_ mm

### 2. Palpation – Ausstrahlungen (bekannt? Wo noch?) (2 Finger mit 1000-2000p, 5 Sekunden, hin und her bewegen)

	<i>links</i>				<i>rechts</i>			
M. temporalis posterior	0	1	2	3	0	1	2	3
M. temporalis medial	0	1	2	3	0	1	2	3
M. temporalis anterior	0	1	2	3	0	1	2	3
M. masseter Ursprung	0	1	2	3	0	1	2	3
M. masseter Bauch	0	1	2	3	0	1	2	3
M. masseter Ansatz	0	1	2	3	0	1	2	3
Kiefergelenk lateral	0	1	2	3	0	1	2	3
retral (geschlossener Kiefer)	0	1	2	3	0	1	2	3

### 3. Kiefergelenkgeräusche Palpation + Ausstrahlungen (bekannt?)

a. <b>Öffnen</b>	<i>links</i>	<i>rechts</i>
Nein	<b>0</b>	<b>0</b>
Knacken	<b>0</b>	<b>0</b>
Reiben	<b>0</b>	<b>0</b>
b. <b>Schließen</b>		
Nein	<b>0</b>	<b>0</b>
Knacken	<b>0</b>	<b>0</b>
Reiben	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Wo sind noch schmerzhafteste Druckpunkte?

### 5. Okklusionsprüfung

Vorkontakte Front, Non-Okklusion rechts/links, Kreuzbiss, instabile Okklusion